



CPL - CATECOLAMINAS SANGUINEO

Finalidade

A epinefrina (adrenalina), a norepinefrina (noradrenalina) e a dopamina são catecolaminas sintetizadas na medula adrenal, cérebro e sistema nervoso simpático. Seu maior uso clínico é no diagnóstico do feocromocitoma, que se origina em 90% dos casos na supra-renal. Esses tumores são causa de hipertensão severa de difícil controle, sendo, em 10% dos casos, malignos. Catecolaminas são compostos lábeis, sendo sua determinação influenciada por uma série de variáveis pré-analíticas como dieta e drogas. Catecolaminas elevadas também são encontradas no trauma, pós-operatórios, frio, ansiedade, suspensão de clonidina e doenças graves intercorrentes.

Material

Sangue

Instruções

- Jejum obrigatório de 8 horas.
- Permanecer 2 dias antes da coleta sem ingerir os alimentos relacionados, pois estes alimentos interferem no resultado:
- Café;

- Chá;
- Chocolates;
- Refrigerantes;
- Frutas em geral (especialmente manga, banana e abacate), sorvetes, sucos de frutas naturais ou artificiais, baunilha e alimentos aromatizados com vanila.
- Caso o cliente faça uso contínuo de algum dos medicamentos abaixo, deve entrar em contato com o médico assistente para avaliar a suspensão do mesmo. A suspensão, assim como o seu período, fica exclusivamente a critério do médico.

- Podem promover aumento de catecolaminas:

- . alfa- bloqueadores (fentolamina, fenoxibenzamina e prazosin);
- . antidepressivos (amitriptilina, amoxapina, desipramina, imipramina e nortriptilina);
- . antihistamínicos (difenhidramina, clorfeniramina e prometazina);
- . antipsicóticos (clorpromazina, clozapina, ferfenazina);
- . beta- bloqueadores (atenolol, labetalol, metoprolol, nadolol, findolol, propranolol, timolol);
- . antagonistas dos canais de cálcio (fenodipina, nicardipina, nifedipina, verapamil);
- . drogas catecolamina-like (L-dopa, epinefrina, norepinefrina, dopamina, metildopa);
- . diuréticos (hidroclorotiazida, furosemida);
- . inibidores da monoaminoxidase (fenelzina);
- . estimulantes (caféina, nicotina, aminofilina, teofilina);
- . simpaticomiméticos (albuterol, anfetaminas, efedrina, isoproterenol, metaproterenol, pseudoefedrina e terbulina);
- . vasodilatadores (diazóxido, hidralazina, isossorbida, minoxidil, nitroglicerina e outros nitratos e nitritos);
- . outros (cocaína, insulina, levodopa, metilfenidato, metoclopramida, morfina, naloxona, fentazocina, proclorperazina e TRH).

- Podem promover diminuição de catecolaminas:

- . anti-hipertensivos (captopril, clonidina, guanabenz, guanetidina, guanfacina, reserpina);
- . antipsicóticos (haloperidol);
- . agonista dopaminérgico (bromocriptina);
- . outros (dissulfiram, metirosina, octreotida).