C223 - IGE ESP (C223) - DROGAS - SULFAMETOXAZOL

Finalidade

Os testes para quantificação de IgE específica são utilizados identificar o alérgeno responsável pelas manifestações alérgicas de um indivíduo como manifestações respiratórias, cutâneas, alimentares, e também hipersensibilidade a drogas. Dependendo dos sintomas do paciente pode ser realizada a pesquisa de anticorpos IgE específicos contra painéis de alérgenos mais comuns para uma triagem quando não houver uma suspeita do provável agente alergênico, ou contra alérgenos específicos isolados, quando existir forte suspeita de alguma substância causadora do quadro alérgico. Testes de RAST em níveis normais ou negativos, na presença de IgE total elevada, podem indicar que as manifestações alérgicas decorrem de outro alérgeno ou, então, que o resultado não está associado ao quadro alérgico, mas, sim, a outras condições clínicas, como doenças parasitárias, nefrite intersticial por fármacos, síndrome hiper-IgE, e doença enxerto versus hospedeiro, entre outras. Por outro lado, é possível que níveis discretos ou moderadamente elevados de anticorpos IgE específicos sejam compatíveis com IgE total dentro da faixa da normalidade. O IgE específico pesquisa um único alérgeno, enquanto o IgE múltiplo constitui um grupo de alérgenos pesquisados em conjunto.

Material

Sangue

Instruções

- Jejum não obrigatório