



ABM - ANTICORPOS IGM ANTI BORRELIA BURGDOFFERI - LYME

Finalidade

A Doença de Lyme é causada pela bactéria *Borrelia Burgdorferi* transmitida pela picada de carrapato do gênero *Ixodes* e, em especial, pela espécie *Amblyomma cajennense*. Sintomas típicos da doença são febre, cefaleia, fadiga e o eritema migratório que geralmente se inicia no local da picada do carrapato expandindo-se para outras partes do corpo. Se não tratado há disseminação da doença. O diagnóstico é baseado nos sintomas, no exame físico e na epidemiologia (possibilidade de contato com carrapatos). Os testes laboratoriais são úteis para o diagnóstico. Os Imunoensaios são utilizados como testes de triagem e, se positivos ou indeterminados devem ser confirmados com Westernblot/imunoblot. A pesquisa de anticorpos IgM não deve ser realizada isoladamente. Para pacientes com sinais e sintomas sugestivos de Doença de Lyme com menos de 30 dias de evolução solicitar IgM e IgG. Para pacientes com sintomas com mais de 30 dias de evolução somente as sorologias de IgG são úteis para auxiliar no diagnóstico. Triagem sorológica (imunoensaios) negativos excluem o diagnóstico de Lyme e outros diagnósticos devem ser considerados.

Material

Sangue

Instruções

Jejum não obrigatório.

