



CFU - COPROLOGICO FUNCIONAL

Finalidade

O estudo coprológico visa o estudo das funções digestivas abrangendo as provas de digestibilidade macroscópicas, exames químicos e outras, cujos resultados permitem diagnosticar os diferentes quadros que são agrupados em síndromes coprológicas: insuficiência gástrica, pancreática e biliar, hipersecreção biliar, (fermentação hidrocarbonada e putrefação), síndromes ileal e cecal, colites e outras alterações do transito intestinal. O desenvolvimento de métodos que permitiram o diagnóstico etiológico separado de cada uma das moléstias agrupadas nestas síndromes, diminuiu a importância diagnóstica do exame funcional de fezes.

Material

Fezes recente a fresco (todo o volume fecal após dieta específica).

Instruções

- Recomendável suspender medicação laxante e/ou supositórios nos 3 dias anteriores e durante a coleta ou conforme orientação médica.
- Evitar o uso de bebidas gasosas (ex: refrigerantes, água gaseificada) e alcoólicas durante os 3 dias que antecedem a coleta.
- Manter dieta habitual ou conforme orientação médica.

- Ingestão de carnes, batatas, feijão, leite e manteiga não interfere no exame.
- Evitar coletar amostra em contato com papéis higiênicos e vasos sanitários.
- Evitar contaminação por urina, água, gordura ou outro elemento.
- Colocar o material no frasco de coleta com o auxílio da pazinha.
- Coletar aproximadamente metade do frasco de fezes (frasco coletor universal) ou 35g da primeira evacuação do dia.
- Manter o material refrigerado até o momento da entrega.
- Material deverá ser encaminhado ao laboratório até 24 horas após coleta.

- No caso de pacientes recém-nascidos e crianças, recomendamos juntar amostra fecal de mais de uma evacuação (mantidas refrigeradas), realizadas no mesmo dia e enviadas em um único frasco, totalizando um total de, no mínimo, 10 gramas, idealmente 15 gramas.